

ຢາປົວພຍາດວັນນະໂຣກ  
ຮາຍລະອຽດສໍາລັບຄົນເຈັບ  
TUBERCULOSIS MEDICATIONS  
Information for patients

ທ່ານກໍາລັງຈະໄດ້ເລີ່ມກິນຢາປົວພຍາດເປັນຊຸດຊຶ່ງໝໍສັ່ງອອກໃຫ້ເພື່ອປົວພຍາດວັນນະໂຣກ (TB) ຂອງທ່ານ. TB ແມ່ນພຍາດຮ້າຍແຮງ ຊຸດນີ້ຈະທຳລາຍສຸຂພາບຂອງທ່ານຖ້າຫາກວ່າບໍ່ທຳການປິ່ນປົວ. ພຍາດ TB ສາມາດຖືກກຳຈັດໃຫ້ຫາຍຂາດໄດ້ ເມື່ອໄດ້ກິນຢາປົວພຍາດ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

**ການຄວບຄຸມ**

ເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ກິນຢາຕາມກຳນົດທີ່ໝໍສັ່ງ. ການກິນຢາແບບບໍ່ສມໍ່າສເມີອາດເຮັດໃຫ້ພຍາດດີ້ຢາ, ຊຶ່ງຈະ ເຮັດໃຫ້ການປິ່ນປົວລຳບາກຍິ່ງຂຶ້ນ.

ເພື່ອຫຼີກເວັ້ນບັນຫາດັ່ງກ່າວ ການປິ່ນປົວພຍາດ TB ທຸກໆແບບຕ້ອງໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມຢ່າງໃກ້ຊິດ. ນີ້ໝາຍເຖິງວ່າຄົນເຈັບຕ້ອງກິນຢາຕໍ່ໜ້າ ພຍາບານຫຼືພະນັກງານແພດອື່ນໆ. ພຍາບານຢູ່ທີ່ຄລິນິກປິ່ນປົວ TB ສາມາດຕອບຄຳຖາມທຸກໆຢ່າງທີ່ທ່ານຢາກຖາມກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວພຍາດ TB ຂອງທ່ານນີ້. ເຂົາເຈົ້າສາມາດຕິດຕາມເບິ່ງອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງໆທີ່ເກີດຈາກການປິ່ນປົວໄດ້ ແລະຖ້າຈຳເປັນ ເຂົາເຈົ້າກໍສາມາດເຮັດນັດໝາຍໃຫ້ທ່ານພົບກັບທ່ານໝໍໄດ້.

ເປັນການຈຳເປັນທີ່ສຸດ ທີ່ທ່ານຕ້ອງກິນຢາຕໍ່ໄປ ຈົນກວ່າທ່ານໝໍທີ່ຄລິນິກປິ່ນປົວ TB ບອກໃຫ້ທ່ານເຊົາກິນຢາໄດ້ (ເຖິງແມ່ນວ່າທ່ານຈະຮູ້ສຶກໂຄ່ຂຶ້ນແດ່ແລ້ວກໍຕາມ), ທັງນີ້ກໍເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພຍາດວັນນະໂຣກກັບຄືນມາເປັນໄດ້ອີກ.

**ເປັນຫຍັງຂ້ອຍຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ກິນຢາພວກນີ້?**

- ເພື່ອກຳຈັດ ພຍາດ TB ໃຫ້ຫາຍຂາດ;
- ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຈຸລິນຊີຂອງພຍາດ TB ເກີດການດີ້ຢາ
- ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ພຍາດ TB ເກີດການແຜ່ຜ່າຍລາມອອກໄປ.

**ມີຢາຫຍັງແດ່ທີ່ໃຊ້ປົວພຍາດ TB?**

ຕາມປົກກະຕິ ຢາທີ່ໃຊ້ປົວພຍາດ TB ແມ່ນຢາຕ່າງໆຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ Isoniazid, Rifampicin, Pyrazinamide ແລະ Ethambutol. ໝໍອາດຈະສັ່ງໃຫ້ກິນຢານີ້ທຸກໆມື້ ຫຼືວ່າ 3 ເທື່ອຕໍ່ອາທິດ.

ທ່ານຕ້ອງກິນຢາຕາມທີ່ໝໍຂອງທ່ານສັ່ງຢ່າງໜ້ອຍເປັນເວລາຫົກເດືອນ. ໃນບາງກໍລະນີທີ່ມີນ້ອຍນັກນ້ອຍໜ້າ ການປິ່ນປົວອາດຕ້ອງໄດ້ເຮັດຕິດຕໍ່ກັນໄປເປັນເວລາເຖິງ 2 ປີ.

ກະຮຸນາຢ່າລິມບອກໃຫ້ພຍາບານຮູ້ຖ້າຫາກວ່າ ດ້ວຍເຫດຜົນໃດເຫດຜົນໜຶ່ງ ທ່ານບໍ່ສາມາດໄປທີ່ຄລິນິກ TB ໄດ້, ຫຼືອາດຈະໃຫ້ພຍາບານມາຫາຢູ່ບ້ານ (ຕົວຢ່າງ ຖ້າທ່ານມີນັດທາງອື່ນອີກ) ເມື່ອຮອດມື້ກິນຢາ ແລະ ພວກເຮົາຈະຊອກຫາວິທີເຮັດນັດໃຫ້ທ່ານໃໝ່.

**ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຕ້ອງໃຊ້ຢາຫຼາຍໆຢ່າງຜ່ອນກັນ?**

ບັນດາຢາປົວພຍາດ TB ແມ່ນຢາປະເພດຕ້ານເຊື້ອ. ຢາເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກແບບຕ່າງໆກັນໃນການຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຂອງ TB. ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຂອງ TB ຕາຍຊ້າ ສະນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຢາປົວຊຸມິດຕ່າງໆປະສົມກັນເປັນຢ່າງຕໍ່າຫຼືເດືອນເພື່ອຂ້າເຊື້ອແບັກທີເຣັຍເຫຼົ່ານັ້ນ.

ຖ້າຫາກວ່າໃຊ້ຢາແຍກກັນເທື່ອລະຊຸມິດ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍຂອງ TB ສາມາດກັບກາຍມາດີ້ຢາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຢ່າງໄວ. ໃນອອສເຕຣເລັຍ, ມີຄົນຈຳນວນໜ້ອຍຈຳນວນໜຶ່ງມີພຍາດ TB ທີ່ດີຕໍ່ຢາຊຸມິດຕ່າງໆທີ່ໃຊ້ປົວ TB. ເມື່ອເກີດເຫດການດັ່ງນີ້ຂຶ້ນ ໝໍອາດຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຢາຕ້ານເຊື້ອຂັ້ນຕົ້ນ ແລະ ການປິ່ນປົວອາດກໍຕ້ອງໃຊ້ເວລາດົນນານຂຶ້ນ.

**ສິ່ງທີ່ຄວນຮະມັດຮະວັງເມື່ອກຳລັງຮັບການປິ່ນປົວພຍາດ TB ຢູ່**

ເຫຼົ່າແລະຢາປາຣາເຊຕາໂມລອາດໄປແຊກແຊງຢາປົວດັ່ງກ່າວ. ການດື່ມເຫຼົ່າຫຼືວ່າການກິນຢາປາຣາເຊຕາໂມລໃນລະຫວ່າງທີ່ທ່ານກຳລັງກິນຢາປົວ TB ຢູ່ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດປະຕິກິຣິຍາທີ່ມີອາການຂ້າງຄຽງ, ຊຶ່ງອາດຈະທຳລາຍສຸຂະພາບຂອງທ່ານໄດ້. ໃນລະຫວ່າງທີ່ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ນັ້ນ ຂໍແນະນຳໃຫ້ທ່ານຫຼີກເວັ້ນການດື່ມເຫຼົ່າ.

ໂປຼດສັງເກດດ້ວຍວ່າ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຮັບການປິ່ນປົວຢູ່ນັ້ນ ປະຈຳເດືອນອາດມາບໍ່ປົກກະຕິ. ຂໍແນະນຳໃຫ້ແມ່ຍິງຫຼີກເວັ້ນຈາກການຖືພາ ໃນລະຫວ່າງທີ່ຮັບການປິ່ນປົວ TB ຢູ່. ປະສິດທິພາບຂອງຢາເມັດຄູມກຳເນີດອາດລົດຖອຍລົງຍ້ອນຢາ Rifampicin, ຊຶ່ງຈະເຮັດໃຫ້ການຄຸມກຳເນີດແບບນີ້ ບໍ່ໄດ້ຜົນໜ້າວາງໃຈໄດ້. ຂໍແນະນຳໃຫ້ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງຮັບການປົວພຍາດ TB ຢູ່ຈຶ່ງໃຊ້ວິທີຄຸມກຳເນີດແບບອື່ນ. ຂໍໃຫ້ປຶກສາກັບໝໍຂອງທ່ານ ວ່າຄວນໃຊ້ວິທີຄຸມກຳເນີດແບບໃດ.

ຖ້າທ່ານຖືພາ ຫຼືວ່າ ໃຫ້ລູກກິນນົມຢູ່ ຈຶ່ງບອກໝໍທີ່ຄລິນິກປົວ TB ໃຫ້ຮູ້ທັນທີ. ອາດຈະຕ້ອງມີການປ່ຽນຢາທີ່ທ່ານກິນຢູ່ນັ້ນ.

ອາດຕ້ອງມີການກວດເລືອດຢ່າງສະເໝີອີກເພື່ອກວດເບິ່ງອາການຂ້າງຄຽງທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນໄດ້. ທ່ານໝໍຂອງທ່ານຈະເປັນຜູ້ຈັດການເຮືອງການກວດຕ່າງໆນີ້ໃຫ້.

**ການກິນຢາຫຼາຍແບບປະສົມກັນ**

ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ບອກໃຫ້ທ່ານໝໍປົວ TB ຮູ້ ຖ້າວ່າທ່ານກຳລັງກິນຢາຢ່າງອື່ນຢູ່ຫຼືວ່າໃຊ້ການປິ່ນປົວແບບສມຸນໄພຢູ່ ເພື່ອວ່າເຮົາຈະສາມາດປະເມີນເບິ່ງອາການຂ້າງຄຽງທີ່ຢາຊຸມິດອື່ນມີຕໍ່ການປົວພຍາດ TB.

ບໍ່ຄວນກິນຢາຮະຈັບກິດໃນທາງເດີນອາຫານຊຶ່ງມີສານອາລູມິນຽມ (ຕົວຢ່າງ Gaviscon) ພາຍໃນສອງຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກກິນຢາປົວ TB. ການປົວແບບໃຊ້ເມທາດອນ ກໍອາດໄປແຊກແຊງຕໍ່ການປິ່ນປົວ TB ໄດ້. ຢາບາງຢ່າງສຳລັບໃຊ້ປົວໂຮກ diabetes, Parkinson's disease, HIV, epilepsy ຫຼື cardiac conditions ກໍອາດມີປະຕິກິຣິຍາຕໍ່ຢາປົວພຍາດ TB ໄດ້. ຖ້າທ່ານກຳລັງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໂຮກໃດໂຮກໜຶ່ງດັ່ງກ່າວຢູ່ ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ບອກທ່ານໝໍປົວ TB ຂອງທ່ານໃຫ້ຮູ້.

**ຈະກິນຢາວິທີໃດ**

ຢາດັ່ງກ່າວຈະເຮັດວຽກໄດ້ຜົນດີທີ່ສຸດ ຖ້າຫາກວ່າທ່ານກິນມັນຜ່ອນໆກັນ ໜຶ່ງຊົ່ວໂມງກ່ອນໜ້າ, ຫຼືວ່າ ສອງຊົ່ວໂມງຫຼັງຈາກ ກິນອາຫານ ແລະທາງທີ່ດີແມ່ນໃຫ້ກິນກັບນ້ຳ. ຖ້າຈະໃຫ້ດີທີ່ສຸດ, ຄວນກິນຢາດັ່ງກ່າວໃນຊ່ວງເວລາດຽວກັນທຸກໆມື້.

ສຳລັບຄົນເຈັບທີ່ມີອາການປວດຮາກ, ຄວນກິນຢາກັບອາຫານເບົາໆ (ເຊັ່ນ ປຶ້ງເຂົ້າຈີ່ແບບແຫ້ງ). ຖ້າທ່ານຮູ້ສຶກວ່າມີອາການປວດຮາກ ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ທ່ານຕ້ອງບອກພະຍາບານຫຼືທ່ານໝໍ.

ຖ້າທ່ານມີບັນຫາໃນການກິນຢາ, ກະຮຸນາປຶກສາເຮືອງນີ້ກັບພະຍາບານຫຼືທ່ານໝໍປົວ TB.

### **ອາການຂ້າງຄຽງຈາກຢາປົວ TB**

ເຊັ່ນດຽວກັບຢາທຸກໆຊະນິດ, ຢາທີ່ໃຊ້ປົວ TB ບາງຄັ້ງກໍອາດເຮັດໃຫ້ເກີດມີອາການຂ້າງຄຽງໄດ້ໃນບາງຄົນ. ຖ້າເກີດອາການດັ່ງກ່າວ, ກະຮຸນາລາຍງານເຮືອງນີ້ໃຫ້ທ່ານໝໍຫຼືວ່າພະນັກງານພະຍາບານທີ່ຄລິນິກປົວ TB ຊາບທັນທີ.

ຖ້າທ່ານເກີດມີອາການບໍ່ປົກກະຕິ, ຫຼືຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍດ້ວຍເຫດຜົນຢ່າງໃດຢ່າງໜຶ່ງ, ກະຮຸນາປຶກສາເຮືອງນີ້ກັບພະຍາບານຫຼືໝໍປົວ TB ຂອງທ່ານ. ຖ້າທ່ານຕ້ອງການໝໍໂດຍດ່ວນຫຼືໂມງເຮັດການ, ໃຫ້ໄປທີ່ຜແນກສຸກເສີນຂອງໂຮງໝໍໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນຂອງທ່ານ ແລະ ໃຫ້ຖືເອົາລາຍຊື່ຢາປົວ TB ທີ່ກິນຢູ່ນັ້ນ ໄປນຳ.

### **ອາການຂ້າງຄຽງຕ່າງໆທີ່ອາດເກີດຂຶ້ນ ແຕ່ວ່າອາດບໍ່ມີແຕ່ພຽງເທົ່ານີ້:**

- ເປັນຕຸ່ມຜິ້ນແລະມີອາການຄັນ
- ປວດຮາກ (ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ), ກິນເຂົ້າບໍ່ແຊບ
- ຜິວໜັງແລະຕາເປັນນິເຫຼືອງ
- ເມື່ອຍອ່ອນເພີ່ມເກີນເຫດ
- ຕາລາຍ, ບໍ່ເຫັນສີແຈ້ງດີ
- ປະຈຳເດືອນມາບໍ່ປົກກະຕິ
- ຖ່າຍທ້ອງ
- ເຈັບຕາມຂໍ້ຢາງຜິດປົກກະຕິ / ປວດບວນແລະອັກເສບຕາມຂໍ້
- ເປັນໄຂ້ຄິງຮ້ອນ, ເຈັບຫົວ ແລະ ເຈັບຕາມກ້ານເນື້ອ
- ເກີດອາການຊ້ຳໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ

ອາການທີ່ເກີດເປັນນິເຫຼືອງໃນນ້ຳຕາ, ຕາມຄອນແທກເລີນຊໍ, ໃນຂໍ້ກະເຖີ ແລະ ໃນນ້ຳປັສວະນີ້ນ ເປັນສິ່ງທົນມະດາສຳລັບຄົນທີ່ກຳລັງ ໄດ້ຮັບການປົວພຍາດ TB ຢູ່ແລະບໍ່ແມ່ນສາເຫດທີ່ຄວນເຮັດໃຫ້ກັງວົນ.

**ໂປຼດຢາລັງເລໃນການໄປປຶກສາທຸກໆເຮືອງທີ່ກ່ຽວກັບປິ່ນປົວກັບທ່ານໝໍປົວ TB ຂອງທ່ານຫຼືປຶກສາກັບພະຍາບານປະຈຳຄລິນິກ.**

ເອກກະສານອ້າງອີງ:

1. Therapeutic Guidelines, Antibiotic, Version 12, 2003
2. Department of Health, Controlling Tuberculosis in NSW 2005